

# 確診隔離幾時完？



陽性測試結果申報平台  
(衛生署)

快速或核酸測試呈陽性後  
向衛生署自行申報

有感染徵狀

快速測試

網上申報



電話申報

1836 119

\*處理需時較長

核酸測試

網上申報



無感染徵狀

高風險因素

- 70歲或以上
- 2-5歲兒童
- 懷孕28周或以上，少於37周
- 有導致免疫力抑制情況的重要病歷

懷孕37周或以上  
及2歲以下幼童

或

有警告徵狀

- 服用退燒藥仍持續發燒(>38.5°C)多於2天
- 體溫<35°C
- 抽搐
- 呼吸困難或氣促
- 失語或不能行動
- 不能甦醒
- 胸痛或腹痛
- 頭暈或意識混亂
- 虛弱或腳步不穩
- 胎兒減少活動
- 持續不能飲食/嘔嘔多於兩天
- 血含氧量水平持續低於95%或以下

申請盡快安排  
社區隔離



(消防處)

在家等候  
安排送入社區隔離設施

出現輕微徵狀  
需求診或查詢

預約「指定診所」求診  
或致電醫管局熱線 1836 115

經評估為情況穩定

經評估  
有需要

入住社區隔離設施

前往急症室

期間佩戴  
電子手環  
並進行健康監測

×未接種/✓接種1劑  
第7日#  
快速測試呈陰性

第7日#  
醫生判斷病情好轉  
且檢測呈陰性

×未接種/  
✓接種1劑  
第14日#  
快速測試  
呈陰性

✓接種2劑  
或以上  
第6及第7日#  
快速測試  
均呈陰性

返家\*繼續隔離

期間佩戴電子手環  
並進行健康監測

第14日#  
快速測試呈陰性  
若陽性：  
每日快測至陰性

若陽性：  
每日快測至陰性

若其中一次陽性：  
每日快測至連續2日陰性

離開隔離設施或  
自由離家(自行剪斷和棄置手環)

\*家居情況許可者才可返家，即同住者中無長者、孕婦等高風險人士；

否則須繼續留在醫院/隔離設施至第14日並且檢測呈陰性

#以接受檢測或樣本翌日為第1日；接受核酸檢測者，若無檢測日期紀錄，則以檢測結果通知當日為第1日

上圖基於衛生署、醫院管理局及消防處截至2022年3月7日之資訊整合而成

HKU  
Med